

Trabajo original

Departamento de postgrado. Facultad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales Coello”.

Violencia en parejas alcohólicas que pertenecen a la policlínica docente “Alex Urquiola Marrero”.

Violence in Alcoholic Couples.”Alex Urquiola Marrero” Teaching Polyclinic.

Emilio Serra Hernández¹, Rúbén Cruz Pérez², Ceida Parra Hijuelos³, Gustavo Aguilera Camejo⁴, Yalily González Serra⁵.

¹ Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Profesor Asistente.

² Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Departamento de MGI, Facultad de Ciencias Médicas. Profesor Asistente.

³ Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Profesor Instructor.

⁴ Especialista de Primer Grado en Epidemiología y Administración de Salud. Profesor Instructor.

⁵ Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral.

RESUMEN

Se realizó un estudio sobre los diferentes tipos de violencia en 30 parejas donde uno o ambos miembros eran portadores de la enfermedad del alcoholismo, en los consultorios del médico de la familia de la policlínica docente “Alex Urquiola Marrero”, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de violencia en parejas alcohólicas. A los miembros de las parejas en estudio se les aplicó una entrevista donde se obtuvo como resultado que el sexo más afectado por el alcoholismo fue el masculino. La violencia estuvo presente en ambos sexos, siendo la psicológica la que prevaleció. Todos los indicadores de violencia física y sexual fueron más utilizados por el sexo masculino. Se recomienda planificar estrategias de intervención en la familia que cambien los resultados negativos de nuestro trabajo.

Palabras clave: violencia, tipos de violencia, parejas alcohólicas.

ABSTRACT

A study on the different types of violence was carried out in 30 alcoholic couples where one or both members were carriers of the disease, at the family doctors' offices from “Alex Urquiola Marrero” Teaching Polyclinic, aimed at deepening on the different types of violence knowledge in alcoholic couples. Both members of the couples were interviewed and the results showed that the most affected sex by alcoholism was the male one, violence was present in both sexes being the psychological the one which prevailed, as well as, the prevalence of physical and sexual violences in male sex. The authors recommended to plan strategies in order to improve the family's behavior related with this topic as one of their main goal.

Key words: violence, types of violence, alcoholic couples.

INTRODUCCIÓN

Esencia o espíritus, es así como se conoció por primera vez en la humanidad el alcohol. Se habla de éste hace más de 10 mil años atrás y ha pasado de una civilización a otra hasta la nuestra, donde aparece como causante de una enfermedad que ha aumentado su incidencia en los últimos años, el alcoholismo, (1, 2, 3). En Cuba el 45,2% de la población consume bebidas alcohólicas con una prevalencia de un 6,6% de alcohólicos, relacionado con hechos de violencia en la pareja. (4). Se ha detectado en numerosas investigaciones que muchas relaciones maritales tienen como forma de resolver los conflictos el empleo de la violencia conyugal. (5) Esta agresiva manifestación evoluciona con el avance gradual del deterioro de la relación de pareja, lo que conlleva a doblegar la voluntad de uno de ellos, siendo la mujer la más afectada. Las actitudes de violencia más utilizadas son la física, la psíquica y sexual. (6)

La palabra violencia viene del latín “violaré” que significa infringir, quebrantar, abusar de otra persona con astucia. (7). La violencia conyugal es una problemática tan extendida como oculta. Existen muchas razones por las cuales tanto la víctima como el victimario intentan disimular y ocultar la situación de maltrato. (8, 9, 10, 11).

En nuestro territorio existen evidencias que revelan la presencia de violencia conyugal, por lo que constituye una preocupación cada vez mayor desde el punto de vista jurídico, educacional y de salud, y es esto precisamente lo que nos lleva a realizar esta investigación, la cual tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de violencia en parejas alcohólicas.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo sobre la violencia en parejas alcohólicas, para lo cual se escogieron 30 pacientes alcohólicos que tenían su pareja y estaban controlados según su médico de familia en la historia clínica familiar, pertenecientes a la policlínica docente “Alex Urquiola Marrero” del municipio Holguín, Cuba, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de violencia en parejas alcohólicas.

Para obtener los datos se realizó una entrevista (anexo 1) por el autor del trabajo, con el consentimiento de las parejas seleccionadas las que debían marcar con una X las respuestas afirmativas. Esta actividad se realizó en la consulta del médico de familia con una frecuencia de una sesión semanal o en el terreno.

Se tuvo en cuenta:

- Violencia psicológica: se refiere al hostigamiento verbal entre los miembros de la pareja a través de insultos, reproches, gritos, burlas, silencios prolongados, amenazas, desprecios, ironías y privación de necesidades psicológicas.
- Violencia física o corporal: es aquella que puede dejar huellas o marcas visibles, o donde exista una manifestación corporal de la violencia que incluye empujones, tirar objetos, bofetadas, mordidas, halar cabellos, patadas, quemar y cortar.

- Violencia sexual: se consideró como la imposición de actos de orden sexual por parte de un miembro de la pareja en contra de la voluntad del otro, este incluye caricias, penetración anal y vaginal, masturbación y penetración de objetos.
- Pareja alcohólica: son aquellas en las cuales al menos un miembro de la misma se encontraba clasificado y controlado como alcohólico dependiente con o sin complicaciones.

En la entrevista se expresó si el paciente había agredido a su pareja con algún tipo de estas violencias (agresor).

Terminada la etapa de recopilación de datos se revisaron las entrevistas con la finalidad de detectar errores, omisiones o duplicidades, comprobando que las mismas fueran útiles y cumplieran con los objetivos propuestos. Los datos se procesaron manualmente. Los cálculos se realizaron en una mini-procesadora SHARP EL 500 LM y el análisis estadístico a través de números enteros y por cientos.

Los resultados se mostraron en cuadros de frecuencia simple y asociación de variables para su mejor comprensión y análisis.

RESULTADOS

Al distribuir los pacientes alcohólicos según sexo (cuadro 1) se encontró que de las 30 parejas investigadas, en tres de ellas el enfermo correspondía al sexo femenino, lo cual representó un 10% y las 27 parejas restantes pertenecieron al sexo masculino. En el análisis de los tipos de violencia según el sexo del agresor (cuadro 2), todos fueron partícipes de este tipo de agresión, lo que representó un 100%. Los indicadores de violencia psicológica de acuerdo con el sexo (cuadro 3) demuestran que el 100% de las parejas la practicaba. En el cuadro 4 aparecen los indicadores de violencia física según sexo, conociéndose que 22 parejas utilizaron este tipo de violencia. La violencia sexual estuvo presente en 14 parejas, con predominio del sexo masculino (cuadro 5).

DISCUSIÓN

Estos estudios se corresponden con los realizados por Ricardo González (1) en nuestro país, y de otros autores (12, 13, 14). A pesar de existir más hombres que mujeres alcohólicas no significa que este dato en ocasiones sea real, pues las mujeres por los tabúes no quieren reconocer públicamente que lo son. Por lo general el sexo femenino es etiquetado como suave, dulce, sentimental, superficial, frágil, dependiente, maternal, etc. y tolera menos su propio desprecio a sí misma.

La violencia psicológica es tan o más dañina que las formas restantes y constituye el recurso más empleado, siendo el sexo femenino donde se aprecia con más frecuencia, pues por lo general el hombre no le permite ejercer otro tipo de violencia. (15, 16, 17, 18). Se plantea que las violencias físicas y sexuales son las más utilizadas por el sexo masculino. (19). Los indicadores reproches, insultos y gritos fueron los más utilizados por ambos sexos, siendo predominantes los insultos en los hombres y los gritos en las mujeres. Algunos autores (20, 21) arrojan resultados similares a los nuestros.

Algunos investigadores afirman (19) que los alcohólicos proyectan en su pareja sus propios conflictos, causan en los demás desajustes emocionales y alteraciones psicológicas que traen como consecuencia relaciones destructivas tan negativas para ellos como para su pareja.

Son los hombres los que referían haber utilizado en mayor número el tipo de violencia física, con predominio en ellos de los empujones, seguidos de las bofetadas y tirar objetos, comportándose de forma similar en las mujeres, tirar objetos, empujones y mordidas. Situación que debe tener su origen en nuestra cultura, que sitúa tradicionalmente al hombre como el más fuerte y a la mujer como la más débil. Estas posiciones extremas y siempre desventajosas para la mujer se han modificado con los cambios humanos y sociales, pero no lo suficiente.

En cuanto a la violencia sexual el sexo femenino sólo utiliza el indicador de las caricias, por el contrario los hombres emplean las caricias en primer lugar, seguido de la penetración vaginal, la penetración anal y la masturbación. Este resultado concuerda con lo expresado por algunos autores (22, 23) quienes plantean que existe una evidente desigualdad en el comportamiento del maltrato de tipo sexual en ambos géneros y que las mujeres constituyen las principales víctimas. Existió predominio del alcohólico masculino en las parejas estudiadas, estando presente en mayor o menor grado todos los tipos de violencia con predominio de la violencia psicológica y física. Todos los indicadores de violencia psicológica fueron empleados por ambos sexos, mientras que los indicadores de violencia física y sexual fueron utilizados por el sexo masculino.

Cuadro 1. Enfermos alcohólicos según sexo.

Sexo	Número	%
Femenino	3	10.0
Masculino	27	90.0
Total	30	100.0

Fuente: entrevista.

Cuadro 2. Tipos de violencia según sexo del agresor.

Tipo de violencia	Femenino		Masculino	
	No.	%	No.	%
Psicológica	30	100.0	30	100.0
Física	4	13,3	18	60,0
Sexual	2	6,7	12	40,0

Fuente: entrevista

N: 30

Cuadro 3. Comportamiento de los indicadores de violencia psicológica de acuerdo al sexo.

Indicadores	Femenino		Masculino	
	No.	%	No.	%
Reproches	19	63.3	21	70.0
Insultos	16	58.3	24	84.0
Gritos	21	70.0	20	66.6
Silencios	8	26.6	6	20.0
prolongados	6	20.0	14	46.7
Amenazas	6	20.0	8	26.6
Desprecios	5	16.6	5	16.6
Ironías	5	16.6	7	23.3
Burlas	4	13.3	8	26.6
Privación de necesidades				

Fuente: entrevista

N: 30 N: 30

Cuadro 4. Comportamiento de los indicadores de violencia física según sexo.

Indicadores	Femenino		Masculino	
	No.	%	No.	%
Empujones	2	50,0	8	44,4
Tirar objetos	4	100.0	4	22,2
Bofetadas	1	25,0	6	33,3
Mordidas	2	50,0	1	5,5
Halar	1	25,0	4	22,2
cabellos	-	-	1	5,5
Patadas	-	-	1	5,5
Quemar	-	-	1	5,5
Cortar				

Fuente: entrevista

N: 4

N: 18

Cuadro 5. Comportamiento de los indicadores de violencia sexual.

Indicadores	Femenino		Masculino	
	No.	%	No.	%
Caricias	2	100	7	58,3
Penetración anal	-	-	1	8,3
Penetración vaginal	-	-	5	41,3
Masturbación	-	-	1	8,3
Penetración de objetos	-	-	-	-

Fuente: entrevista

N: 2

N: 12

CONCLUSIONES

Existió predominio del alcohólico masculino en las parejas estudiadas, estando presente en mayor o menor grado todos los tipos de violencia con predominio de la psicológica y física. Todos los indicadores de violencia psicológica fueron empleados por ambos sexos, mientras que los indicadores de violencia física y sexual fueron utilizados por el sexo masculino.

BIBLIOGRAFIA

1. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization; 2002.
2. Heise L, Ellsberg M, Gottmoeller M. A global overview of gender-based violence. *Int J Gynaecol Obstet* 2002; 78 Suppl 1:S5-14.
3. Campbell J. Health consequences of intimate partner violence. *Lancet* 2002; 359:1331-6.
4. Ministério da Saúde. Plano nacional de prevenção da violência. Brasília: Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da Saúde; 2004.
5. Rodrigues A, Mousse S, Mendes T. Marcadas pelo medo. *O Globo* 2003, 29 Jun; *Jornal da Família*, p. 5.
6. Deslandes SF, Gomes R, Furtado MC, Silva P. Caracterização dos casos de violência doméstica contra a mulher atendidos em dois hospitais públicos do Rio de Janeiro. *Cad Saúde Pública* 2000; 16:129-37.
7. Vargas JD. Familiares ou desconhecidos? A relação entre os protagonistas do estupro no fluxo do Sistema de Justiça Criminal. *Rev Bras Ciênc Soc* 2002; 14:63-82.
8. Schraiber LB, d'Oliveira AF. Violence against women and Brazilian health care policies: a proposal for integrated care in primary care services. *Int J Gynaecol Obstet* 2002; 78 Suppl 1:S21-5.
9. Moraes CL, Reichenheim ME. Domestic violence during pregnancy in Rio de Janeiro, Brazil. *Int J Gynaecol Obstet* 2002; 79:269-77.
10. Soares LE, Soares BM, Carneiro LP. Violência contra a mulher: as DEAMs e os pactos domésticos. In: Soares LE, organizador. *Violência e política no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião/Relume-Dumará; 2003. p. 65-106.
11. Menezes TC, Amorim MMR, Santos LC, Faúndes A. Violência física doméstica e gestação: resultados de um inquérito no puerpério. *Rev Bras Ginecol Obstet* 2003; 25:309-16.
12. Mendes CHF. *Vozes do silêncio: estudo etnográfico sobre violência conjugal e fertilidade feminina* [Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Instituto Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz; 2005.
13. Hasselmann MH, Reichenheim ME. Adaptação transcultural da versão em português da Conflict Tactics Scales Form R (CTS-1), usada para aferir Violência no casal: equivalências semântica e de mensuração. *Cad Saúde Pública* 2003; 19:1083-93.
14. Stata Corporation. Survey data manual. Stata statistical software: release 9. College Station: Stata Corporation; 2005.
15. Heise LL, Ellsberg M, Gottmoeller M. Ending violence against women. Baltimore: Population Information Program, School of Public Health, Johns Hopkins University; 1999. (Population Reports, Series L, 11).
16. Heise L, Gracia-Moreno C. Violence by intimate partners. In: Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization; 2002. p. 87-121.
17. Jewkes R, Levin J, Penn-Kekana L. Risk factors for domestic violence: findings from a South African cross-sectional study. *Soc Sci Med* 2002; 55:1603-17.
18. Taft AJ, Watson LF, Lee C. Violence against young Australian women and association with reproductive events: a cross-sectional analysis of a national population sample. *Aust N Z J Public Health* 2004; 28:324-9.

19. Harrykissoon SD, Rickert VI, Wiemann CM. Prevalence and patterns of intimate partner violence among adolescent mothers during the postpartum period. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156:325-30.
20. Rickert VI, Wiemann CM, Harrykissoon SD, Berenson AB. The relationship among demographics, reproductive characteristics, and intimate partner violence. Am J Obstet Gynecol 2002; 187:1002-7.
21. Johnson MP, Ferraro KJ. Research on domestic violence in the 1990s: making distinctions. J Marriage Fam 2000; 62:948-63.
22. Moraes CL, Hasselmann MH, Reichenheim ME. Adaptação transcultural para o português do instrumento "Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)" utilizado para identificar a violência entre casais. Cad Saúde Pública 2002; 18:163-75.
23. Moraes CL, Reichenheim ME. Cross-cultural measurement equivalence of the Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) Portuguese version used to identify violence within couples. Cad Saúde Pública 2002; 18:783-96.
24. Ministério da Saúde. Direitos humanos e violência intrafamiliar. Informações e orientações para agentes comunitários de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2001.

Correspondencia: Dr. Emilio Serra Hernández, apartado postal No. 292 Holguín, 80100.Cuba.
Teléfono: 474447. Correo electrónico: serra@fcm.hlg.sld.cu

ANEXO

Modelo de Entrevista:

Por este medio pretendemos informarle el objetivo de la investigación, explicarle los tipos de violencia que se pueden ejercer en la pareja y ponerle ejemplos. Los datos suministrados por Ud. no le provocarán daños a su matrimonio y se mantendrá absoluta discreción sobre los mismos. Si Ud. está de acuerdo con realizar esta entrevista y conste firme: _____.

- 1) Sexo: Femenino: _____ Masculino: _____.
- 2) Escolaridad: Primaria _____ Secundaria _____ Preuniversitario _____ Universitario.
- 3) Marque con una X de las siguientes manifestaciones, cuáles ha utilizado usted sobre su pareja.

_____ Reproche	_____ Amenazas	_____ Gritos.
_____ Desprecios	_____ Privación de necesidades.	_____ Ironías
_____ Insulto	_____ Silencios prolongados.	_____ Burlas
- 4) Marque con una X de las siguientes manifestaciones, cuáles ha utilizado usted sobre su pareja:

_____ Empujón.	_____ Tirar objetos	_____ Bofetadas	_____ Mordida	_____ Quemar
_____ Halar cabellos	_____ Patadas	_____ Cortar.		
- 5) Marque con una X de las siguientes manifestaciones, cuáles ha utilizado usted sobre su pareja.

_____ Caricias	_____ Penetración anal	_____ Penetración vaginal	_____ Masturbación.
_____ Penetración de objetos.			

[Indice Anterior](#) [Siguiente](#)