

Resumen de Congreso

Policlínico Universitario Dr. Manuel Díaz Legra

Factores de riesgo en la aparición de la neoplasia intraepitelial cervical

Intraepitelial Cervical Neoplasia Risk Factors

Yudilaude Gómez Pérez¹, Ricardo Gómez Sainz², Edelmira Prats Rodríguez³, Olga Antonia Álvarez Estrabao⁴

- 1 Especialista de Primer Grado en Ginecología y Obstetricia. Máster en Atención Integral a la Mujer. Asistente. Policlínica Díaz Legra. Holguín
- 2 Especialista de Primer Grado en Ginecología y Obstetricia. Instructor. Policlínica MININT
- 3 Licenciada en enfermería. Policlínica Díaz Legra. Holguín
- 4 Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral Asistente. Policlínica Manuel Díaz Legra. Holguín

RESUMEN

Se realizó un estudio analítico de casos y controles que incluyó a pacientes, con citologías alteradas (Neoplasia Intraepitelial Cervical), atendidas en la Consulta de Patología de Cuello pertenecientes a la Policlínica Manuel Díaz Legra durante el año 2009. El objetivo de este trabajo fue de evaluar el comportamiento de algunas variables y su relación con la aparición la neoplasia intraepitelial cervical. Se trabajó con una población de 1875 pacientes a las que se le realizó citología en el periodo y la muestra quedó constituida por las mujeres con citologías alteradas como grupo estudio y que cumplieron con criterios de inclusión. Se formó un grupo control de forma aleatoria y en igual número que el anterior. Se analizaron las siguientes variables: edad, número de abortos, total de partos, edad de la menarquía, así como

de las primeras relaciones sexuales. El índice de positividad fue de 2,51. La edad promedio fue de 35,94 años, predominaron las pacientes con uno o dos partos (71,7%) y con menarquía entre 10 y 12 años (47,82%). La edad de las primeras relaciones sexuales se comportó como factor de riesgo. La neoplasia intraepitelial cervical responsabilidad atribuible a los factores de riesgo de la osciló entre 80,22 a 86,63% y la probabilidad de aparición de esta patología varió entre 2,34 y 4,83 veces. Se concluyó que la educación sexual a la adolescente fue un pilar importante para la prevención de la neoplasia intraepitelial cervical.

Palabras clave: neoplasia intraepitelial cervical, cuello de útero/ citología, factores de riesgo

Correspondencia: Dra. Yudilaude Gómez Pérez.

Dirección: Carretera Central No 93 A % 6ta y prolongación de Maceo. Holguín.

Teléfono: 426222

Correo electrónico: ygozmez@crystal.hlg.sld.cu