

Resumen de Trabajo

Universidad de Ciencias Médicas

Aspectos clínicos y epidemiológicos del aborto inducido en pacientes del área de salud de Mayarí

Clinical Epidemiological Aspects on Induced Abortion in Patients of Mayarí Health Area

*Maylin Reyes Aguilera*¹, *Niumila Merencio Leyva*², *José Rubén Rodríguez Llano*³,
*Reynier Soria Pérez*⁴

- 1 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructora. Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Universitaria 26 de Julio. Mayarí
- 2 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructora. Máster en Longevidad Satisfactoria. Policlínica Universitaria 26 de Julio. Mayarí
- 3 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Residente de primer año de la Especialidad de Urología. Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín Holguín
- 4 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Especialista de Primer Grado en Anestesiología y Reanimación. Instructor. Máster en Longevidad Satisfactoria. Hospital Docente Mártires de Mayarí

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo sobre el aborto inducido en pacientes del área de salud de Mayarí en el primer semestre de 2009. La muestra estuvo representada por 100 pacientes escogidas al azar, de la totalidad de las pacientes embarazadas que se sometieron a la interrupción del embarazo. Una vez obtenida la información, se confeccionó una base de datos, los cuales se procesaron de forma manual, se

vaciaron en tablas y se expresaron en porcentajes. Las mujeres que predominaron tenían de 15 a 20 años de edad, eran solteras y estudiantes. Prevalcieron las mujeres que no tenían hijos y que no utilizaban métodos anticonceptivos.

Palabras clave: aborto inducido, mujeres, planificación familiar

ABSTRACT

A descriptive study about induced abortion in Mayari health area during the first semester, 2009 was carried out .A random sample was selected which comprised 100 patients from all pregnant women who decided to interrupt their pregnancies. All information was collected in a database, and the results were showed through tables. Single student women between 15 and 20 years old prevailed, as well as women without children and those who had no contraceptives.

Key words: induced abortion, women, family planning

Correspondencia: Dra. Maylin Reyes Aguilera. Calle Ampliación. Calixto García # 13. Mayarí. Holguín. Cuba. Correo electrónico: maylin@mayari.hlg.sld.cu Teléfono: 502602