

Resumen de Trabajo

Policlínica Universitaria de la Comunidad Juan Manuel Páez Inchausti. Moa. Holguín

Comportamiento de la enfermedad poliquística renal autosómica dominante en pacientes con insuficiencia renal crónica

Dominant Autosomal Renal Polycystic Disease Behavior in Chronic Renal Failure Patients

Nordis Rodríguez Monges¹, Katiel Llorente Azahares² María Elena Mulet³, Alina Katia Laffita Labori⁴, Irma Agné Fuentes Rodríguez⁵

- 1 Especialista en Primer Grado de Medicina General Integral. Instructor. Policlínica Universitaria Juan Manuel Páez Inchausti. Moa. Holguín
- 2 Especialista en Primer Grado de Medicina General Integral. Instructor. Policlínica Universitaria Juan Manuel Páez Inchausti. Moa. Holguín
- 3 Máster en Salud Ambiental. Especialista de Primer Grado en Nefrología. Especialista de Primer Grado de Medicina General Integral. Instructor. Hospital Guillermo Luis Fernández Hernández Baquero
- 4 Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista en Primer Grado de Medicina General Integral. Instructor. Policlínica Rolando Monterrey
- 5 Especialista en Medicina Interna. Instructor. Policlínica Juan Manuel Páez Inchausti. Moa. Holguín

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo sobre la morbilidad de la enfermedad poliquística renal autosómica dominante (EPRAD) para dar seguimiento sistemático de las familias afectadas y su atención genética, así como sus factores agravantes. El universo fueron las 16 familias afectadas y la muestra quedó formada por

171pacientes. A través de la revisión de la historia clínica en la Consulta de Nefrología de Riñón sano de la Policlínica y las visitas a cada familia se obtuvo la información necesaria para realizar su caracterización clínica, genética y epidemiológica. Treinta pacientes desarrollaron la enfermedad, de estos, 25 con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, 5 en hemodiálisis y dos fallecidos después del trasplante. Predominó el sexo femenino en 16 pacientes (55,1%). Como complicación, 29 de los pacientes presentaron hipertensión arterial para el 96,6% y la edad de diagnóstico predominante fue de 30-39 años (14 pacientes) que representó el 48,2%.

Palabras clave: enfermedad poliquística renal autosómica dominante, factores de riesgo, hipertensión arterial

ABSTRACT

A descriptive study on the morbidity of autosomal dominant polycystic renal disease was done for the systematic monitoring of the affected families and their genetic attention and the risk factors. The universe comprised 16 affected families and the sample 171 patients. Through the review of the clinical history at Nephrology Outpatient Clinic Healthy kidney Consulting Room and the visits of each family, the necessary data were collected for this study. Thirty patients developed the disease, and 25 of them were diagnosed with chronic renal failure. carry ,5 of the patients with hemodialysis procedure and two deaths after transplant with a female predominance of 16 patients (55.1%) . Twenty nine patients had hypertension as a complication (96.6%) and the predominant age of diagnosis was between 30-39 (14 patients) representing 48.2% of them.

Key words: dominant autosomal renal polycystic disease, risk factors, high blood pressure

Correspondencia: Nordis Rodríguez Monges. Correo: nordisr@moa.hlg.sld.cu

Teléfono centro de trabajo: 604102