

Trabajo original**Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello****Algunos factores maternos relacionados con el bajo peso al nacer.**

Maternal factors associated with low weight at birth.

Nirian Eliza Infanzón Lorenzo ¹, Tatiana Zoila Ochoa Roca ², Lizzy Piña Suárez ³,
Luís Roberto Cruz Tomás ⁴, Mayra Velásquez Pavon ⁵.

1. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba
2. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Profesor Auxiliar. Policlínico Universitario René Ávila Reyes. Holguín. Cuba
3. Master en Urgencia Estomatológica. Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Clínica Mario Pozo Ochoa, Holguín. Cuba
4. Master en Urgencia Estomatológica. Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Clínica Mario Pozo Ochoa, Holguín. Cuba
5. Master en Atención Integral a la mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de identificar una serie de elementos maternos involucrados como incidentes en el bajo peso al nacer, de 37 casos analizados del año 2009 al 2010, procedentes del Municipio Holguin. Las variables estudiadas fueron: edad, valoración nutricional, ganancia de peso, trastornos hipertensivos, antecedentes obstétricos y el hábito de fumar. Factores asociados de manera significativa a recién nacidos de bajo peso fueron: la desnutrición materna, ganancia escasa de peso, niño anterior con menos de 2 500 g, hipertensión arterial y tabaquismo

Palabras clave: factores de riesgo, Bajo Peso al nacer, niño.

ABSTRACT

A descriptive study with the aim of identifying a series of maternal elements involved as incidents in the low weight at birth, of 37 cases analyzed in the year 2009 to 2011, from the municipality of Holguín. The variables studied were: age, nutritional assessment, gain weight, hypertensive disorders, obstetric history, and smoking. Factors associated with significantly low birth weight newborns were: maternal malnutrition, gain little weight, previous child with less than 2 500 g, high blood pressure and smoking

Key words: risk factors, low birthweight, child.

Correspondencia.

Dra. Nirian Eliza Infanzón Lorenzo. Correo electrónico neliza@crystal.hlg.sld.cu