

Artículo original

Hospital Universitario Vladimir I Lenin

Bajo peso al nacer. Algunas variables perinatales. Hospital V. I. Lenin.**Some perinatal variables in low birth weight. V. I. Lenin Hospital**

Amelia Bajuelo Páez ¹, Nirian Eliza Infanzón Lorenzo ², Adisnubia Boué Ávila ³,
Yanelis Cáceres Fonseca ⁴ *Joaquin Solarana Ortiz* ⁵

1. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Ginecología y Obstetricia. Instructor. Hospital VI Lenin. Holguín. Cuba
2. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba
3. Master en Atención Integral al niño. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario Pedro del Toro. Holguín. Cuba
4. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor, Policlínico Universitario Mario Gutiérrez Ardaya. Holguín. Cuba
5. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y Cirugía. Instructor. Hospital Universitario Vladimir I Lenin. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo de series de casos en la maternidad del Hospital Universitario VI Lenin en el periodo comprendido entre enero – julio 2011, con el objetivo de caracterizar algunas variables perinatales relacionadas con el bajo peso al nacer, entre las variables que se tuvieron en cuenta tenemos las formas

clínicas del bajo peso al nacer, tipo de gestación, edad materna, antecedentes obstétricos, tiempo de gestación al parto, peso al nacer y puntaje APGAR .El Universo estuvo constituido 276 gestantes que tuvieron un producto con peso al nacer inferior a 2500 gramos y la muestra quedó conformada por los 261 casos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Concluimos que existe tendencia a la estabilización en la incidencia del bajo peso al nacer. Los recién nacidos pretérminos predominaron como forma clínica, con edad materna de 24,8 años, con tiempo de gestación medio de 36 semanas, y con antecedente de aborto. Fueron más frecuentes los neonatos obtenidos por parto por cesárea, por compromiso del bienestar fetal, con peso medio de 2041 gramos, y calificados como vigorosos. Se hicieron recomendaciones en aras de posibilitar la retroalimentación a la atención primaria de cada uno de los casos con riesgo de aportar un recién nacido bajo peso.

Palabras claves: Bajo Peso al Nacer, perinatología.

ABSTRACT

A descriptive case series study was carried out in the maternity ward of the Hospital Universitario VI Lenin in the period between January July 2011, with the objective of characterizing some variables perinatal related with low weight at birth, between the variables were taken into account have shapes clinical low weight at birth, gestation type, maternal age, obstetric history, time of gestation to delivery, birth weight and APGAR score. The universe was formed 276 pregnant women who had a product with weight birthweight less than 2500 grams, and the sample was comprised of the 261 cases that met the criteria for inclusion and exclusion. We conclude that there is tendency to stabilization in the incidence of low weight at birth. The newborn preterm predominated as clinical form, with 24.8 maternal age, gestational age with means of 36 weeks, and with a history of abortion. Infants obtained by delivery by caesarean section, for commitment to fetal well-being, with average weight of 2041 grams, and qualified as a vigorous were more frequent. Made recommendations in order to enable feedback to primary care of each one of the cases with risk of bringing a newborn under weight.

Key words: low birthweight, perinatology.

Correspondencia

Dra. Amelia Bajuelo Páez. Correo electrónico. Amelia@hvil.hlg.sld.cu