

Artículo original

Policlínico Universitario Julio Grave de Peralta

Comportamiento de algunos factores asociados a embarazadas adolescentes. Policlínico Julio Grave de Peralta. Enero - Septiembre/2011. Holguín.

Behavior of some factors associated with pregnant adolescents. "Julio Grave de Peralta" Polyclinic. January - September/2011. Holguín.

Roberto Carlos Carracedo Beltrán¹ Hancel Caballero Castellanos² Aris Almenares Garcés³

1. Master en Atención Integral a la Mujer. Licenciado en Enfermería. Asistente. Policlínico Universitario Julio Grave de Peralta. Holguín. Cuba
2. Master en Urgencias Médicas. Especialista en Primer Grado Medicina general integral. Instructor. Policlínico Universitario Julio Grave de Peralta. Holguín. Cuba
3. Master en Atención Integral a la Mujer. Licenciada en Enfermería. Instructora. Policlínico Universitario Julio Grave de Peralta. Holguín. Cuba

RESUMEN

La adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones, donde se hace posible el descubrimiento de uno mismo, de los demás y de la ampliación del horizonte individual. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, en la provincia de Holguín, en el periodo de Enero 2010 a Enero 2011, el universo estuvo comprendido por 12188 embarazadas y la muestra la constituyeron 2409 entre catorce y diecinueve años. Con el objetivo general de caracterizar el comportamiento de

algunos factores de riesgo asociados a las embarazadas adolescentes y en específico: identificar el grupo de edad, nivel de escolaridad, determinar el estado nutricional de las embarazadas en la captación, causas de morbilidad, la edad gestacional al parto, elaborar un programa de intervención educativa y diseñar un material didáctico de lactancia materna. Obteniendo como principales resultados que predominaron las adolescentes entre 18 y 19 años para un 61.1 %, el nivel escolar de secundaria básica aportó 242 casos para un 47.3 %, el 54.1 % de las adolescentes en estado de gestación se captaron de forma intermedia y con un peso deficiente para un 60.7%, el parto a término fue el más frecuente con 1901 pacientes para un 78.9 %. Se concluyó que las embarazadas adolescentes presentan factores de riesgos que exponen su estado de salud y el de sus hijos. Se elaboró un programa de intervención educativa y el diseño de un material didáctico de lactancia materna.

PALABRAS CLAVE: Embarazo, Adolescencia, Factores de Riesgos

ABSTRACT

The adolescence is accustomed to be the age of the contradictions and incomprehensions, where the discovery of one, of the other ones and of the enlargement of the individual horizon becomes possible. The methods used in this investigation were descriptive and retrospective study of the adolescent pregnant in the province of Holguín, in the period from January 2010 to January 2011, the universe was understood for 12188 pregnant and shows was constituted for to 2409 teens made pregnant among fourteen nineteen years. Keeping in mind as general objective with to characterize the behaviour of some associated risk factors to the flustered teens adolescent and in specific: to identify the age bracket, level of scholarship, the obstetricians antecedent that predominated in the flustered teens adolescent and to determine the been nutritional of the pregnant women in the reception and the age crush to elaborate a the educational intervention program and to design a didactic the breast-feeding material. The results demonstrate that predominated as principal aftermaths that the teens among 18 and 19 predominated years for a 61.1. the level the basic- secondary school student 242 contributed cases for a 47.3. It was concluded that the flustered teens present risk factors that expose his health status and the of his children and to elaborated the educational intervention program and to design a didactic the breast-feeding material.

Keys word: Pregnancy / Adolescence / Risk Factors

Correspondencia

Lic. *Roberto Carlos Carracedo Beltrán*. Correo electrónico rccb@dps.hlg.sld.cu