

Artículo original

Policlínico Universitario Darío Calzadilla Angulo.

Comportamiento de la Hipertensión Arterial en Adultos Mayores. Consultorio 4. Policlínica Darío Calzadilla Angulo, Banes. Enero – Diciembre del 2010.**Behavior of high blood pressure in older adults. Clinic 4. Dario Calzadilla Angulo Polyclinic, Banes. January to December 2010**

Ángel F González Sarduy,¹ Sara Iris Romero Cuenca², Mario Sánchez Zaldivar³, Yanet Córdova Escobar⁴

1- Master en longevidad satisfactoria. Especialista en primer grado en Medicina Interna. Universidad de Ciencias Médicas Holguín. Holguín. Cuba

2- Master en Longevidad Satisfactoria. Especialista en primer grado en Medicina General Integral Facultad de Medicina “Mariana Grajales Coello”. Holguín. Cuba

3- Especialista en primer grado en Medicina Interna. Hospital V I Lenin. Holguín. Cuba

4- Master en Atención Integral a la mujer. Especialista en primer grado en Medicina General Integral Facultad de Medicina “Mariana Grajales Coello. Holguín

RESUMEN

Se efectuó un estudio descriptivo, retrospectivo, con el objetivo de caracterizar las morbilidades más frecuentes que originaron ingresos en los servicios de Medicina interna Del Hospital Clínico Quirúrgico del Municipio de Banes, provincia Holguín en pacientes mayores de 60 años durante el periodo Enero – Diciembre 2010. El universo estuvo constituido por 146 pacientes que fueron hospitalizados en el período de la investigación, la muestra fue de 70 adultos mayores que cumplieron

esta condición para nuestro estudio. Se utilizó para la recolección del dato primario el registro estadístico del centro y los expedientes clínicos los criterios de medidas de resumen utilizados para expresar los resultados de las variables estudiadas fueron el porcentaje, y el promedio. Las variables estudiadas fueron, la edad, el sexo, los diagnósticos Definitivos, las complicaciones ocurridas durante el período de Ingreso, y el estado de los pacientes al alta El grupo de edades en el que predominaron los ingresos fue de 60-65 años no encontrándose diferencias notorias en relación al sexo. Las Entidades que originaron mayor número de ingreso predominando el sexo femenino y la raza mestiza. La etiología de la HTA más frecuente fue la Esencial, grado I y la mayor afectación en los órganos diana, fue en el corazón. Se identificó la presencia de HTA sistólica aislada y la pseudohipertensión.

Palabras Claves: Hipertensión Arterial, Adulto Mayor

ABSTRACT

Retrospective, descriptive study with the objective of characterizing the morbidities more frequent income that they originated in the services of internal medicine of the Hospital Clínico Quirúrgico in the municipality of Banes, Holguín province in patients over the age of 60 years during the period January - December 2010 was carried out. The universe was made up of 146 patients were hospitalized in the period of the investigation, the sample of 70 older adults who met the condition for our study. The statistical records of the Center was used for the collection of primary data and clinical records summary measures criteria used to express the results of the studied variables were the percent and the average. The studied variables were age, sex, diagnosis Definitivos, complications which occurred during the period of income, and the State of patients upon discharge the age group in which predominated the income was 60-65 years not found notable differences in relation to sex. Entities that originated more income dominant female and mixed race. The etiology of the commonest ETS was essential, grade I and greater involvement in the target organs, was in the heart. We identified the presence of isolated systolic hypertension and the pseudohipertensión.

Keywords: Hypertension, elderly

Correspondencia

Dra. Sara Iris Romero Cuenca. Correo electrónico sarairis@ucm.hlg.sld.cu