

Trabajo Original

Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello

Evolución clínica del bajo peso al nacer en el hogar de recuperación nutricional. Holguín.2010

Clinical evolution of the low birth weight infants in the nutritional recovery home. Holguín. 2010

Gliset Hung Arroyo¹, Luís Antonio Liy Rodríguez², Nirian Eliza Infanzón Lorenzo³, Normelvis Infanzón Lorenzo⁴ Caridad Zaldivar Ramírez⁵

1. Master en Atención Integral al Niño. Especialista de Primer Grado en Pediatría. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba
2. Master en Salud y Desastres Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Dirección Provincial de salud. Holguín. Cuba
3. Master en Atención Integral a la mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba
4. Licenciada en Tecnología de la Salud. Instructor. Policlínico Pedro del toro Saad. Holguín. Cuba
5. Master en Atención Integral al Niño. Especialista de Primer Grado en Medicina general Integral. Asistente. Policlínico René Ávila. Holguín. Cuba

RESUMEN:

Se realizó un estudio descriptivo de niños nacidos bajo peso, en el hogar de recuperación nutricional de Holguín, durante el año 2010 con el objetivo de evaluar la evolución clínica del bajo peso. Se identificaron los antecedentes maternos que incidieron en el nacimiento de estos niños y las variables neonatales que repercutieron en la morbilidad del neonato, así como la correlación de las dimensiones materna y neonatal. Se determinó el coeficiente dinámico de

recuperación. Se concluyó que predominaron las madres comprendidas entre 20 y 35 años, amas de casa, con alto nivel escolar, nulíparas, que presentaron toxemia y anemia durante el embarazo fueron la que más influencia tuvieron en el bajo peso al nacer y con un apgar normal, asociado al distres respiratorio transitorio, bronconeumonía, hipoglicemia y anemia, se encontraron dentro de los de mayor repercusión. La recuperación del bajo peso fue rápida. Recomendamos Desarrollar estudios similares en instituciones relacionadas con el BPN que permitan mantener el seguimiento de la evolución clínica de estos niños y programas educativos para lograr que las gestantes de riesgo lleguen al final del embarazo en las mejores condiciones para tener recién nacidos de buen peso

Palabras Claves: bajo peso al nacer, recuperación nutricional

ABSTRACT

A descriptive study of children born underweight, in-home nutritional recovery of Holguín during the year 2010 with the objective of evaluating the clinical evolution of low weight. The maternal antecedents that influence on the birth of these children and neonatal variables that affected the infant morbidity, as well as the correlation of maternal and neonatal dimensions were identified. The dynamic coefficient of recovery was determined. He was concluded that mothers aged between 20 and 35 years predominated, housewives, high school, nulliparous, showing toxemia and anaemia during pregnancy were more influence had in low birth weight and with a normal apgar, associated with the transient respiratory distress, bronchopneumonia, hypoglycemia and anemia, found within the greater impact. Underweight recovery was rapid. We recommend to develop similar studies in institutions associated with LBW, allowing you to keep track of the clinical evolution of these children and educational programs to ensure that risk pregnant reach at the end of pregnancy in the best conditions to have newly good weight

Keywords: low birth weight infants, nutritional recovery

Correspondencia

Dra. Gliset Hung Arroyo: Correo electrónico ghung@ucm.hlg.sld.cu