

Artículo original

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

Factores de riesgo asociados a la aparición de Enfermedad Hipertensiva Gestacional. Policlínico René Ávila Reyes.2011**Risk factors associated with gestational hypertensive disease. René Polyclinic.2011**

Tatiana Zoila Ochoa Roca ¹, Niriam Elisa Infanzón Lorenzo ², Adisnubia Bué Avila³, Mirtha Leyva Suárez ⁴ , Caridad Zaldívar Ramírez ⁵

1. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Profesor Auxiliar. Policlínico“ René Ávila Reyes. Holguín. Cuba
2. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba
3. Master en Atención Integral al Niño. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Pedro del Toro Saad. Holguín. Cuba
4. Master en Atención Integral a la Mujer..Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Dirección Municipal de Salud. Holguín. Cuba
5. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico René Ávila Reyes. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y controles para determinar los factores de riesgos que inciden en la aparición de la enfermedad

hipertensiva gestacional en el Policlínico "René Ávila Reyes" Holguín, en el año 2011. El universo estuvo constituido por 384 gestantes que recibieron atención prenatal en esta área en el periodo estudiado. La muestra por 184 gestantes las que fueron divididas en dos grupos: casos y controles con pareamiento 1 a 1. Se utilizó el Chi Cuadrado y la razón de productos cruzados (Odds Ratio) para determinar la posible asociación e influencia de los factores estudiados. Los factores de riesgo que influyeron significativamente en la aparición de la enfermedad hipertensiva gestacional fueron: edades extremas para la gestación, un bajo nivel educacional, una situación económica desfavorable, presencia de antecedentes patológicos personales y familiares de enfermedad hipertensiva gestacional anterior o hipertensión arterial, la nuliparidad, la valoración nutricional de sobrepesa u obesa y un funcionamiento familiar desfavorable.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo asociados, gestantes, enfermedad hipertensiva gestacional

ABSTRACT

An analytical retrospective case-control study was conducted to determine the risk factors affecting the appearance of in the polyclinic "René Avila Reyes" gestational hypertensive disease Holguín, in 2011. The universe was formed by 384 pregnant women who received antenatal care in this area in the period studied. The sample by 184 pregnant women who were divided into two groups: cases and controls with vaccine matching 1 to 1. Chi square and the reason for crossed products (Odds Ratio) is used to determine the possible Association and influence of the factors studied. The risk factors that significantly influenced the emergence of gestational hypertensive disease were: extreme age for pregnancy, a low educational level, an unfavourable economic situation, presence of personal and family pathological history of hypertension or previous gestational hypertensive disease, the parity, obese or sobrepesa nutritional assessment and an unfavorable family functioning.

Key words: Risk factors associated, pregnant, gestational hypertensive disease

Correspondencia

Tatiana Zoila Ochoa Roca. Policlínico René Ávila Reyes ochoa@cristal.hlg.sld.cu