

Artículo original

Clínica Estomatológica Mario Pozo Ochoa

**Factores de riesgo de la enfermedad periodontal en adolescentes.
2006/2007****Risk factors for periodontal disease in adolescents. 2006 / 2007**

Mariela Grave de Peralta Hijuelos⁽¹⁾ *Amarilis Álvarez Sosa*⁽²⁾

1. Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Instructor.
Clínica Estomatológica Mario Pozo Ochoa. Holguín. Cuba
2. Licenciada en Radiofísica Médica. Asistente. Hospital Universitario V. I
Lenin. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, con el objetivo de describir algunos Factores de Riesgos de la Enfermedad Periodontal en adolescentes, del consultorio 36 del policlínico "Dr. Manuel Díaz Legrá". La muestra estuvo representada por 291 pacientes, 165 féminas y 126 masculinos. Se estudió la edad, sexo, nivel educacional, caries ínter-proximales, restauraciones defectuosas, retención de alimentos, apiñamiento, sarro, higiene, tabaquismo, alcoholismo; la prevalencia de la enfermedad periodontal y su asociación con estas variables. La recolección de la información fue mediante un formulario y un simple examen bucal, se aplicó el Índice de Higiene Bucal Revisado por la OMS, como medidas resúmenes se utilizó los números absolutos y por cientos. La edad de 15 años y el sexo femenino fueron las que predominaron en este estudio. El nivel de escolaridad alcanzado fue 9no grado con el 66.7 %. Los factores de riesgos afectaron más el sexo masculino, predominó la higiene bucal deficiente con 68.7%; seguido del sarro y por último las restauraciones defectuosas. La prevaecía fue de 60.1%, con más

incidencia en el femenino; la higiene bucal deficiente y el apiñamiento resultaron ser los de mayor asociación ante la presencia de la enfermedad periodontal, haciéndose necesario establecer estrategias educativas que involucren todos los factores de la comunidad para mejorar el estado de salud bucal y disminuir los factores de riesgo de la enfermedad periodontal.

Palabras Claves: Enfermedad Periodontal, Adolescentes

ABSTRACT

He was a descriptive, cross-sectional study, aiming to describe some factors of risk of Periodontal disease in adolescents of the Office 36 polyclinic "Dr. Manuel Diaz Legrá". The sample was represented by 291 patients, 165 women and 126 men. Studied the age, sex, educational level, inter-proximal caries, defective restorations, retention of food, overcrowding, scale, hygiene, smoking, alcoholism; the prevalence of periodontal disease and its association with these variables. The collection of information was using a form and a simple oral examination, oral hygiene index reviewed by who, as measures summaries used the absolute numbers and percent was applied. The age of 15 years and females were that predominated in this study. The level of education reached was 9th grade with 66.7%. The risk factors most affected male, the prevailing poor oral hygiene with 68.7%; followed by scale and finally the defective restorations. The prevalence was 60.1%, with more emphasis on the feminine; poor oral hygiene and the crowding turned out to be greater partnership in the presence of periodontal disease, making necessary to establish educational strategies involving all the factors of the community to improve the status of oral health and decrease the risk factors for periodontal disease.

Keywords: Disease Periodontal, teenagers

Correspondencia

.Lic. *Amarilis Álvarez Sosa*. Correo electrónico. amarilis@hvil.hlg.sld.cu