

Trabajo Original.**Morbilidad de la madre adolescente****Morbidity of the adolescent mother**

*Nirian Eliza Infanzón Lorenzo*¹, *Tatiana Zoila Ochoa Roca*², *Mayra Velásquez Pavon*³. *Maria Lucía Vázquez Concepción*⁴

- 1- Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba
- 2- Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Profesor Auxiliar. Policlínico Universitario René Ávila Reyes. Holguín. Cuba
- 3- Master en Atención Integral a la mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba
- 4- Máster en Atención Integral a la mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario Pedro Díaz Coello. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio retrospectivo de caso control, con la finalidad de conocer la morbilidad del embarazo en las adolescentes atendidas en el hospital "Vladimir Ilich Lenin" durante el año 2010. El grupo estudio fue de 123 adolescente y se comparó con un grupo control representado por las gestantes de 20 a 24 años (n = 328) atendidas en dicho centro, en igual periodo de tiempo. Datos referentes a antecedentes patológicos y complicaciones del embarazo, parto y puerperio, se recogieron en una encuesta habilitada al efecto y se procesaron utilizando el sistema estadístico SPSS. Entre los resultados más relevantes se destacan la alta incidencia

de bajo peso materno, la mayor frecuencia de infecciones vaginales, anemia, hipertensión inducida y parto instrumentado, así como desgarros cervicales y hemorragia puerperal entre las adolescentes.

Palabras Clave: Morbilidad, adolescente, madre adolescentes.

ABSTRACT

A retrospective case-control study was undertaken with the purpose of knowing the morbidity of pregnancy in the adolescents attended at "VI Lenin" Hospital during, 2010. The study group was made up of 123 adolescents and it was compared with the control group composed of expectants between 20 and 24 years old. Data referring to pathological history and pregnancy complications, delivery and puerperium, were collected in a survey. Data were processed by the SPSS statistical system. The high incidence of maternal low birth, the higher frequency of vaginal infections, anemia, induced hypertension and instrumental delivery, as well as cervical tearings and puerperal hemorrhage in adolescents were among the most relevant results.

Keywords: Morbidity, adolescent, teenage mother.

Correspondencia.

Dra. Nirian Eliza Infanzón Lorenzo. Correo electrónico neliza@crystal.hlg.sld.cu