

Resumen de Trabajo

Policlínico Universitario Alex Urquiola Marrero

Factores de riesgo en mujeres con lesiones crónicas en vagina y endocervix**Risk factors in women with chronic lesions in the vagina and endocervix**

Yadnil E Gómez Vázquez ¹, Priscilla Pérez San Juan ², Leticia Mármol Caballero ³
Osmani Góngora Ramírez ⁴ Sulma Rivas García.

1. Máster en atención integral a la mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
2. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
3. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
4. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
5. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de caracterizar los factores de riesgo de las mujeres con lesiones crónicas en vagina y endocervix, pertenecientes al CMF

21 del Policlínico Docente Universitario y de la Familia Alex Arsenio Urquiola Marrero en el período comprendido entre septiembre 2010 a agosto del 2011.

El universo estuvo constituido por 416 mujeres y la muestra quedó representada por 123 féminas de dicho consultorio. Las variables estudiadas fueron: Edad, escolaridad, ocupación, parejas sexuales, estado civil.

Se aplicó una encuesta en la que se obtuvo como resultado que 65.85% del total de las pacientes estudiadas, hubo un predominio de infección vaginal del grupo de 15 - 24 años, lo que evidencia que la población mas joven, es la más propensa a sufrir estas patologías por ser esta edad la de mayor actividad sexual y con más de una pareja, en el estado la escolaridad y el nivel educacional bajo que se encuentran en las amas de casa, es predictivo de las infecciones vaginales, en el estado civil las solteras y sin vínculo legal son las más afectadas.

Se recomienda realizar estudios similares en todos los Consultorios Médicos de la Familia y hacer llegar los resultados del mismo a las instancias superiores

Palabras Claves: Factores de riesgo, lesiones crónicas en vagina, yendocervix

ABSTRACT

A descriptive study to characterize the risk factors of women with chronic lesions in the vagina and endocervix who belong to the number 21 family doctor's office of the Alex Urquiola Marrero Teaching Polyclinic from September 2010 to August 2011 was conducted. The universe consisted of 416 women and the sample was represented only by 123 females from the above mentioned office. The variables studied were: age, education, occupation, sexual partners and marital status. The results of a survey was that in 65.85% of the patients studied there was a prevalence of vaginal infection in the age group of 15 to 24 years which shows that the youngest population is most prone to suffer from these conditions because this age group is the most sexually active with multiple partners as well as in the low educational level found in housewives which is predictive of vaginal infections. The most affected groups were made up of single women and those without legalized marital status. Similar studies are recommended in all Family Medical Offices and thus report these results to higher levels of the health system.

Keywords: Risk factors, injury chronic in vagina, yendocervix

Correspondencia:

Dra. Yadnil E Gómez Vázquez. Correo electrónico yadnilhg@infomed.sld.cu