

**Resumen de Trabajo**

Policlínico Universitario Alex Urquiola Marrero

**Factores de Riesgo relacionados con el Bajo Peso al Nacer. Policlínico universitario Alex Urquiola Marrero. Enero-diciembre 2011**

**Factors of Risk related with the First floor Weight when being born. Policlinic Alex Urquiola Marrero. January-December 2011.**

Yamilé Rosales Luis<sup>1</sup>, Yadnil Elizabeth Gómez Vázquez<sup>2</sup>, Priscilla Pérez Sanjuán<sup>3</sup>, Annia Maria Fernández Seguí<sup>4</sup>, Enma A Ávila Tarragó<sup>5</sup>

1. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
2. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
3. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
4. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba
5. Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario Alex Urquiola. Holguín. Cuba

**RESUMEN**

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo a una muestra de 20 recién nacidos bajo peso durante el periodo enero-diciembre del 2011, pertenecientes al Policlínico

Alex Urquiola Marrero; con el objetivo de determinar los factores relacionados con el Bajo Peso al nacer y partiendo de ellos diseñar una Estrategia de Intervención Educativa. Iniciamos con la recogida de los datos a partir de la Historia Clínica Obstétrica y Pediátrica de cada paciente, los cuales fueron procesados utilizando el método porcentual, con ayuda de un ordenador. Los resultados fueron representados en tablas de frecuencia simple; facilitando su análisis y discusión. Concluimos que predominaron las pacientes entre 18 y 34 años de edad, con una valoración nutricional y ganancia de peso inadecuada, la Infección Vaginal, la Enfermedad Hipertensiva Gravídica y el parto pretérmino constituyeron factores que influyeron considerablemente en la problemática. Recomendamos extender la estrategia de intervención educativa resultante de esta investigación, a nuestra área de salud y al resto de las áreas de nuestro Municipio.

Palabras Claves: Factores de Riesgo, Bajo Peso al Nacer

## **ABSTRACT**

It was carried out a retrospective descriptive study to a sample of 20 recently born under weight during the period January-December of the 2011, belonging to the Policlínica Alex Urquiola Marrero; with the objective of determining the factors related with the First floor Weight when being born and leaving of them to design a Strategy of Educational Intervention. We begin with the collection of the data starting from each patient's Obstetric and Pediatric Clinical History, which were processed using the percentage method, with the help of a computer. The results were represented in charts of simple frequency; facilitating their analysis and discussion. We conclude that the patients prevailed between 18 and 34 years of age, has a nutritional valuation and inadequate gain of weight Is Vaginal Infection, the Illness Hypertensive Dravidic and the childbirth preterm no constituted factors that influenced considerably in the problem. We recommend to extend the strategy of intervention educational resultant of this investigation.

Keywords: Risk factors, low birth weight

## **Correspondencia:**

Dra. Yamilé Rosales Luís. Correo electrónico. [yamiles@crystal.hlg.sld.cu](mailto:yamiles@crystal.hlg.sld.cu)

