

Resumen de artículo

Universidad Ciencias Médicas. Holguín

Caracterización de la población femenina con cáncer cérvico uterino en la Policlínica Alcides Pino**Description of Female Population with Cervix Cancer. Alcides Pino Polyclinic**

Iris Marlenis Mora Espinosa¹, Idalmis Rivas Molinares², Maria de los Ángeles Garcell Rodríguez³, Mayra Nestora Velázquez Pavón⁴, Dimitri Bárbaro Oliva del Rey⁵

- 1 Licenciada en Enfermería. Instructor. Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Alcides Pino Bermúdez
- 2 Licenciada en Enfermería. Instructor. Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Alcides Pino Bermúdez
- 3 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral .Instructor. Máster en Enfermedades Infecciosas. Policlínica Alcides Pino Bermúdez
- 4 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Máster en Atención Integral a la Mujer. Facultad de Ciencias Médicas
- 5 Especialista de Primer Grado en Urología. Instructor. Hospital Clínico Quirúrgico

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo de series de casos de la Policlínica Alcides Pino Bermúdez de Holguín, se incluyeron las pacientes con citologías orgánicas positivas durante el año 2008-2009, con el objetivo de conocer el comportamiento del cáncer cérvico uterino y algunos factores de riesgos para actuar sobre ellos y disminuir su incidencia. La información se recogió del tarjetero de citología, historia clínicas de las pacientes y las encuestas realizadas. Las variables estudiadas fueron: edad, antecedentes obstétricos desfavorables, conducta sexual, edad de inicio de las primeras relaciones sexuales, antecedentes de trastornos ginecológicos y el resultado de la citología orgánica. Se obtuvo que la mayoría de las pacientes

estudiadas fue diagnosticada precozmente como NIC II o displasia moderada como las más frecuentes. En el grupo de 25 a 34 años predominaron las citologías alteradas. El comienzo de las relaciones sexuales correspondió a las edades de hasta 20 años y hasta tres parejas sexuales. El aborto y la cervicitis constituyeron los factores asociados de más alta incidencia.

Palabras clave: cáncer, displasia cervical moderada, cervicitis

ABSTRACT

A descriptive study at Alcides Pino health area was carried out. The patients with positive cytologic test results, between 2008-2009 were included in this study. The objective of this work was to know the cervix cancer behavior in these women , as well as some risk factors in order to diminish the disease incidence. The information was taken from the cards , clinical histories and the survey. Some variables were studied : age, unfavorable obstetric history, sexual behavior, age of the first sexual intercourse, gynecological disorders history, cytological results. The results showed that most of patients had an early diagnosis of NIC II and dysplasia as the most frequent one. The age group between 25 and 30 years was the prevalent one regarding the positive cytological test results. Considering the first sexual intercourse the patients of 20 years predominated and had at about three couples. Abortion and cervicitis represented the associated factors of highest incidence.

Key words: cancer, moderate cervix dysplasia, cervicitis

Correspondencia: Iris Marlenis Mora Espinosa. Correo electrónico

irismarlenis@cristal.hlg.sld.cu