

**Resumen de artículo**

Misión Médica Cubana. República Bolivariana de Venezuela

**Comportamiento del riesgo preconcepcional en el consultorio El Turagual, Motatán****Preconceptional Risk Behavior at Turagual, Motatan Consulting Room Clinic**

*Gilberto Quevedo Freitas<sup>1</sup>, Leovigildo Leyva Delgado<sup>2</sup>*

- 1 Máster en Educación Médica. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Coordinación Docente Estado Trujillo. Estado Trujillo. Venezuela. Misión Médica Cubana.
- 2 Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor. Coordinación Docente Estado Trujillo. Estado Trujillo. Venezuela. Misión Médica Cubana.

**RESUMEN**

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con el objetivo de describir el comportamiento del riesgo preconcepcional en el consultorio El Turagual, del municipio Motatán, en el estado Trujillo, Venezuela, en el período de enero a julio de 2008. El universo de estudio estuvo constituido por las 134 pacientes registradas con riesgo reproductivo en el período mencionado, se trabajó con una muestra de 65 pacientes, la que se seleccionó por el método aleatorio simple. Para la recogida de los datos se revisaron las historias clínicas individuales y familiares. Se estudiaron las siguientes variables: edad, estado civil, factores de riesgo asociados y los métodos anticonceptivos utilizados. Se trabajó con números absolutos y porcentajes como medida para cada variable utilizada y los resultados de la investigación se

presentaron en tablas. Predominó el grupo de edades de 35 a 49 años de edad y el estado civil soltero. Los factores de riesgo más frecuentes fueron la inestabilidad sexual, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Los dispositivos intrauterinos y las píldoras anticonceptivas fueron los métodos anticonceptivos de mayor uso. Se concluyó que el riesgo reproductivo se asocia con la vulnerabilidad que presentaron algunos grupos de personas en la comunidad, por lo que es importante conocer este aspecto para el trabajo preventivo del médico.

*Palabras clave:* riesgo preconcepcional, métodos anticonceptivos, factores de riesgo

## **ABSTRACT**

A descriptive and retrospective study, aimed at describing the preconceptional risk behavior at Turagual consulting room Motatán municipality, in Trujillo state, Venezuela, from January to July 2008 was carried out. The universe comprised 134 patients recorded as reproductive risk. The sample was represented by 65 patients by random selection. To collect the information, the clinical and family histories were reviewed. The following variables were studied: age, marital status, risk factors and contraceptive methods used. Absolute numbers and percentages methods were also used. There was a predominant age group (35-49 years) and a prevalence of the single marital status. The sexual instability, hypertension and diabetes mellitus were the most frequent risk factors. The intrauterine devices and contraceptive pills were the most used contraceptive methods. The authors concluded the reproductive risk is associated with the vulnerability of some groups of people in the community, it is important for the preventive doctor's work.

*Key words:* preconceptional risk, contraceptive methods, risk factors.

Correspondencia: Gilberto Quevedo Freites. Correo electrónico quevedo@elam26.pri.sld.cu