

Resumen de Trabajo

Policlínica Universitaria Pedro Díaz Cuello

Infección vaginal en gestantes hospitalizadas en el Hospital de Vladimir Ilich Lenin

Vaginal Infection in Pregnant Women Hospitalized in Vladimir Ilich Lenin Hospital

*Blanca Tang Rodríguez*¹, *Amelia Bajuelo Báez*², *Nirian E Infanzón Lorenzo*³, *Mildred Labrada García*⁴

- 1 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Universitaria Pedro Díaz Cuello. Holguín. Cuba
- 2 Especialista de Primer Grado en Ginecobstetricia. Instructor. Policlínica Universitaria Manuel Días Legrá. Holguín. Cuba
- 3 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Universitaria Dr. Manuel Díaz Legrá
- 4 Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Máster en Educación Médica Superior. Policlínica Universitaria Manuel Días Legrá. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio observacional descriptivo con el objetivo de determinar el comportamiento de la de infección vaginal en 518 gestantes hospitalizadas durante el primer semestre de 2009 en el Hospital Provincial General Docente Vladimir Ilich Lenin, de las cuales 160 embarazadas presentaron algún tipo de infección vaginal para el 30,8%. El segundo grupo de edades de mayor frecuencia fue el de las embarazadas adolescentes; la vaginosis bacteriana y levaduras (candidiasis)

fueron las infecciones más diagnosticadas; el bajo peso al nacer fue la complicación más relacionada con la infección. Los tratamientos más utilizados fueron metronidazol para la vaginosis y clotrimazol para la candidiasis.

Palabras clave: vaginosis bacteriana, embarazadas adolescentes, candidiasis

ABSTRACT

A descriptive study aimed to determining the behavior of vaginal infection in 518 pregnant women hospitalized in the first half of 2009 at Vladimir Ilich Lenin Provincial General Teaching Hospital was performed. 160 pregnant women of the sample had some type of vaginal infection (30.8 %). Pregnant teenagers were the second most frequent age, bacterial vaginosis and yeast (candidiasis) were the most frequently diagnosed infections, being underweight at birth complication related to infection. The treatments used were metronidazole for vaginosis and clotrimazole for candidiasis.

Keywords: bacterial vaginosis.

Correspondencia: Nirian E Infanzón Lorenzo .Dirección electrónica
neliza@cristal.hlg.sld.cu